

CENTAUREA SISYMBRIIFOLIA, SPECIES ORIENTALIS NOVA.

Par J. ARÈNES.

Centaurea (Seridia DC). sisymbriifolia spec. nov.

C. viridis, caule simplici monocephalo 45-55 cm. alto laxo araneoso, stirpe robusta simplici vel 2-3 — furcata, lignosa. Folia usque 20 cm. longa et 8 cm. lata, utrinque, viridia et aspera, basalia et caulina inferiora pinnatipartito-runcinata, inferne in petiolum longe attenuata, lobis lateralibus 5-6 oblongis vel ovatis vel triangularibus acutis, lobo terminali valde major (usque 11 cm. longo et 6 cm. lato) ovato vel elliptico acuto, caulina superiora oblonga vel linearia sessilia, floralia nulla, caulina inferiora anguste decurrentia. Calathidia mediocria, solitaria; periclinium ovoideum, basi rotundatum, apice contractum, 20-25 mm. longum, \pm 15 mm. latum, leviter araneosum, bracteis ovatis enervatis; appendices minutissimae, fuscae, patulo-erectae vel erectae spinis 5-7 — palmatis (usque 8 mm.) robustis \pm vulnerantibus, mediis vix longioribus. Corollae flavae, haud radiatae. Achenia glabra, pappo albo setis usque 8-10 mm. longis quam achenium longioribus. — Typus in Herb. Mus. Paris; D^r T. Baytop leg., sine n^o.

Turquie d'Europe. — Aydos (Istanbul).

D'après les diagnoses de la flore de Boissier (Fl. or. III) et les collections de l'Herbier du Muséum, les espèces orientales à corolles jaunes de la section *Seridia* se distingueront de la façon suivante :

1. Plante entièrement blanche-tomentueuse. Aigrette égalant l'akène *C. hololeuca*
- 1'. Plante non entièrement blanche-tomentueuse.
 2. Plante verte.
 3. Feuilles entières, lancéolées brièvement décurrentes. Appendice à II — 13 épines courtes. Aigrette égalant l'akène....
C. lancifolia
 - 3'. Feuilles au moins en partie pinnatipartites-runcinées. Appendice à 5-9 épines.
 4. Appendices étalés ou réfléchis, à 7-9 épines robustes, la médiane bien plus développée. Péricline globuleux. Aigrette plus courte que l'akène..... *C. lycophilolia*
 - 4'. Appendices étalés-dressés ou dressés à 5-7 épines longues, robustes, la médiane à peine plus développée. Péricline ovoïde. Aigrette plus longue que l'akène. *C. sisymbriifolia*
 - 2'. Feuilles vertes et glabrescentes en dessus, blanches tomenteuses en dessous. Aigrette plus courte que l'akène.....
C. cheiracantha

Les caractères de *C. sisymbriifolia* discriminatifs par rapport aux 4 autres espèces sont : ceux des feuilles (pinnatipartites, roncées, vertes et rudes sur les 2 faces), ceux des appendices périclinaux (très petits, bruns, étalés-dressés ou dressés) et de leurs épines (5-7, longues, robustes, la médiane à peine plus longue), ceux des akènes (aigrette bien plus longue que l'akène glabre).